

KDAJ SEM V STRESU?

Vzroki za stres: neustrezni bivalni pogoji in socialna struktura skupine, neprimerna prehrana, neprimerno rokovanje, neustrezno zdravstveno varstvo; invazivnost z zajedalci, motena rast.

Znaki stresa: Skrivanje/povlečenje glave in nog v oklep, mirovanje, slaba rast, neješčnost, driska, izcedek iz nosu.

Priporočamo obisk pri veterinarju pred ali po nakupu živali. Preventivno 1 x letno in v primeru bolezni. Veterinar opravi tudi pregled iztrebkov na prisotnost zajedavcev. Pomembno je tudi higiensko in sprotno odstranjevanje iztrebkov iz terarija.

Po nakupu želvi omogočimo nekaj dni miru, da se navadi na novo okolje. V tem času z njo ne rokujemo in je ne vzemirjamo.

Grška želva je zavarovana žival in uvrščena v CITES dodatek II. Vsako žival spremlja CITES dokument, označena mora biti z mikročipom.



BOLEZNI, KI JIH LAHKO PRENAŠAM

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka (npr. salmonela in druge škodljive bakterije, ki so pogosto prebivalci črevesne mikroflore).

Ukrepi:

Po rokovanju z živaljo si umijemo roke, da se ne okužimo. Salmonela se lahko naseli v človeških prebavilih in povzroča prebavne težave.

Poostrena higiena se priporoča pri: otrocih, starejših, nosečnicah in osebah z oslabeлим imunskim sistemom.

Prisotnost salmonele lahko preveri veterinar z mikrobiološko preiskavo.

Je dolgoživ ljubljeneec, zato preden se podaš v nakup, dobro premisli, ali je izbira prava?



Avtorji:

Peter Omejc, Maša Rajšp, Valentina Kubale, Jožko Račnik, Zlatko Golob

Oblikoval:

Matic Čič, ALUO



Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta



KDO SEM?



GRŠKA ŽELVA (*Testudo hermanni*)

Pričakovana življenjska doba	50-70 let, lahko tudi čez 100 let
Telesna masa	1-4 kg
Dolžina telesa	do 35 cm
Dnevna bivalna temperatura	25-30 °C
Temperatura vroče točke	45 °C

Zahtevnost/čas



Denar



Obiski veterinarja



KDO JE PRIMEREN LASTNIK?

Primeren lastnik je lahko vsak, ki želvi zagotovi ustrezno bivališče, prehrano in po potrebi ustrezno veterinarsko oskrbo. Bolni plazilci znake bolezni skrivajo, zato si vzamemo čas, da spoznamo želvi-no obnašanje in ob spremembah hitro ukrepamo.

Otroci lahko skrbijo zanjo le pod nadzorom staršev.

Potrebuje vsakodnevno hranjenje, odstranjevanje iztrebkov in redno spremljanje telesne teže.

ŽELVA NI ŽIVAL ZA LJUBKOVANJE, AMPAK OPAZOVANJE.

S ČIM SE PREHRANJUJEM?

Paša v zunanji ogradi:

- **trave in seno**
- **zelišča:** regrad, trpotec, kislica, marjetice, malina, majaron, melisa, origano, bazilika, timijan, jagodnjak, ognjič, kapucinke, vijolice, detelja, lucerna, glavinci, listi trte in fižola



- **dodatek zelenjave:** radič, paradižnik, paprika, kumare, korenje, buče

- **peleti:** lucerna, koprive in seno

Ohrovt in zelje v večjih količinah nista priporočljiva, saj zavirata delovanje ščitnice.



Deformiran oklep zaradi hranjenja samo z briketi v obdobju treh let.

KAJ POTREBUJEM ...

Notranji terarij za čas pred in po hibernaciji ter zunanja ograda (270 x 130 cm)	100-200 €	☐
Podlaga: lesni sekanci, lubje, žaganje, slama	10 €	☐
Sadike sredozemskih rastlin	20 - 40 €	☐
Posoda za vodo	20 €	☐
Termometer in higrometer	5 €	☐
Lopatka za čiščenje in odstranjevanje iztrebkov	10 €	☐
Hrana: trava, zelišča, zelenjava, seno	10 €	☐
Osvetlitev in ogrevanje: grelna žarnica in UVB žarnica (kombinirana)	20-40 €	☐
Nastavki za žarnice	5-30 €	☐
Časovnik (regulacija dolžine osvetlitve)	5 €	☐
Termostat: regulacija optimalne temperature z dnevnim in nočnim ritmom	50 €	☐
Skupni stroški	400 €	
Mesečni vzdrževalni stroški	15-30 €	

POTREBUJEM PRIMERNO BIVALNO TEMPERATURO

Za gretje notranjih prostorov uporabljamo grelne žarnice. Priporočamo uporabo kombiniranih UVA in UVB žarnic. Poslužimo se lahko tudi talnega gretja. **Priporočamo termostat, ki regulira dolžino osvetlitve ter minimalno in maksimalno temperaturo.**

HIBERNACIJA

Pozimi grški želvi omogočimo hibernacijo. Hibernira naj 4-5,5 mesecev pri temperaturi 5-7 °C. Mlajše živali zbudimo že prej. Pred hibernacijo jo okopamo v topli vodi da izprazni črevo, po njej da nadomesti izgubljeno tekočino. **HIBERNACIJA JE POGOJ ZA USPEŠNO RAZMNOŽEVANJE.**

DOLOČANJE SPOLA

Samec: (desno) manjši, vbočen trebušni del oklepa, daljše marginalne ploščice nad zadnjimi nogami, daljši rep, daljše zadnje noge
Samica: (levo) večja, raven trebušni del oklepa, okroglejši oklep, krajši rep

