

KDAJ SEM V STRESU?

Vzroki za stres: neustrezen bivalni prostor oz. higiena in prehrana, pretirano rokovanje z njo ter neprimerna socialna struktura skupine in slabo zdravstveno varstvo.

Znaki stresa: Skrivanje/povlečenje nog in glave v oklep, neješčnost, mirovanje, driska, izcedek iz nosu.

Priporočamo ciklični (ob nakupu, spomladi in jeseni) pregled iztrebkov na zajedalce.

Po nakupu želvi omogočimo nekaj dni miru, da se navadi na novo okolje. V tem času z njo ne rokujemo in je ne vzemirjamo.

Širokoroba želva je zavarovana žival in uvrščena v CITES dodatek II. Vsako žival spremlja CITES dokument, označena mora biti z mikročipom.

KDO JE PRIMEREN LASTNIK?

Primeren lastnik je vsak, ki je želvi pripravljen zagotoviti ustrezno bivališče, ogrevanje, osvetlitev in prehrano. Širokoroba želva je največja evropska kopenska želva, zato že ob nakupu mladiča dobro premislimo, kje ga bomo nastanili, ko odraste. Želva ni primerna za ljudi brez vrta ali zunanjega prostora, kjer bi lahko prebivala čez poletje.

Potrebuje dnevno oskrbo: priprava hrane, odstranjevanje iztrebkov, menjava vode ...

ŽELVA NI ŽIVAL ZA LJUBKOVANJE, AMPAK OPAZOVANJE.

BOLEZNI, KI JIH LAHKO PRENAŠAM

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka (npr. salmonela in druge škodljive bakterije, ki so pogosto prebivalci črevesne mikroflore).

Ukrepi:

Po rokovanju z živaljo si umijemo roke, da se ne okužimo z bakterijami. Okužba se lahko kaže s prebavnimi motnjami (driska).

Poostrena higiena se priporoča pri: otrocih, starejših ljudeh, nosečnicah in osebah z oslabeлим imunskim sistemom.

Prisotnost salmonele lahko preveri veterinar z mikrobiološko preiskavo.

Je dolgoživ ljubljeneč, zato preden se podaš v nakup, dobro premisli, ali je izbira prava?

Avtorji: Peter Omejc, Maša Rajšp, Valentina Kubale, Jožko Račnik, Zlatko Golob
Oblikoval: Matic Čič, ALUO



Javni študijski, razvojni, invalidski in preživinski sklad Republike Slovenije



EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta



KDO SEM?



ŠIROKOROBA ŽELVA

(*Testudo marginata*)

Pričakovana življenjska doba	50-70 let, lahko tudi čez 100 let
Telesna masa	do 5 kg
Dolžina telesa	24-40 cm
Dnevna bivalna temperatura	25-30 °C
Nočna bivalna temperatura	20°C
Hibernacija	2,5-3,5 mesecev
Temperatura vroče točke	45°C
Trajanje osvetlitve	12 ur/dan
Zahtevnost/čas	⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚
Denar	€ € € € €
Obiski veterinarja	🩺 🩺 🩺 🩺 🩺

S ČIM SE PREHRANJUJEM?

Paša v zunanji ogradi:

- **trave in seno**
- **zelišča:** regrad, trpotec, marjetice, malina, majaron, melisa, origano, bazilika, timijan, jagodnjak, ognjič, kapucinke, vijolice, detelja, glavinci, listi trte in fižola



- **dodatek zelenjave:** radič, paradižnik, paprika, kumare, korenje, buče

- **peleti:** lucerna, koprive in seno

Ohrovt in zelje v večjih količinah nista priporočljiva, saj zavirata delovanje ščitnice.



KAJ POTREBUJEM ...

Notranji terarij za čas pred in po hibernaciji ter zunanja ograda (320 x 160 cm) 150-300 €

Nastilj: sekanci, žaganje, šota, skorja 20 €

Zasaditev zunanje ograde s sredozemskimi rastlinami 30-50 €

Posoda za vodo 20 €

Termometer in higrometer 5 €

Lopatka za čiščenje in odstranjevanje iztrebkov 10 €

Hrana: trava, travniška zelišča, seno, zelenjava 10 €

Osvetlitev in ogrevanje: grelna žarnica in UVB žarnica (kombinirana) 20-40 €

Nastavki za žarnice 5-30 €

Časovnik (regulacija dolžine osvetlitve in uravnavanje temperature preko dneva in noči) 5 €

Termostat: regulacija optimalne temperature z dnevnim in nočnim ritmom 50 €

Skupni stroški 500 €

Mesečni vzdrževalni stroški 15-30 €

POTREBUJEM PRIMERNO BIVALNO TEMPERATURO

Poleti imamo želve v zunanji ogradi. V terariju potrebujejo visoke temperature bivalnega prostora (vroča točka 45 °C). Priporočamo uporabo grelnih žarnic, ki proizvajajo kombinirane UVB in UVA žarke.

Priporočamo termostat, ki regulira dolžino osvetlitve ter minimalno in maksimalno temperaturo.

HIBERNACIJA

Pozimi širokorobi želvi omogočimo hibernacijo. Hibernira naj 2,5-3,5 mesecev pri temperaturi 5-8 °C. Mlajše živali zbudimo že prej. Pred hibernacijo jo okopamo v mlačni vodi, da odstranimo zaostalo vsebino iz črevesja in po njej, da nadomesti izgubljeno tekočino. **HIBERNACIJA JE POGOJ ZA USPEŠNO RAZMNOŽEVANJE.**

