

Navodilo čebelarjem za zatiranje varoj na podlagi individualnega spremljanja napadenosti z varojami v testnih čebelnjakih VF NVI, izvedenega v obdobju 2. – 9. julij 2020

Rezultati ugotavljanja napadenosti z varojami vsake čebelje družine v prvi polovici julija, to je spremljanje naravnega odpada varoj, ugotavljanje napadenosti čebel ter ugotavljanje napadenosti trotovske in čebelje zalege, nam dajejo podlago za individualno nujno potrebno izvedbo zatiranja varoj takoj, ko so presežene posamezne mejne vrednosti napadenosti. Ob takojšnjem ustreznem znižanju stopnje napadenosti odložimo prvo enotno zatiranje varoj na stojišču na čas po končani hojevi paši oziroma po zadnjem točenju. Prvi pogoj za izvedbo zatiranja je prisotnost pogojne zaloge hrane v plodišču panja (8 kg) in odstranitev vsega medišnega satja pred pričetkom zdravljenja družine.

V naših testnih čebelnjakih smo pri posameznih družinah v tem obdobju že ugotovili presežen prag škodljivosti napadenosti z varojami. Družine s preseženim pragom naravno odpadlih varoj, preseženo napadenostjo čebel in/ali trotovske zalege potrebujejo takojšnje učinkovito zatiranje varoj. Zato čebelarjem svetujemo, da preverijo napadenost v vseh čebeljih družinah, saj bodo le tako lahko pravočasno ukrepali. Po naših opažanjih v testnih čebelnjakih so z varojami v tem času močnejše napadene družine, kjer je matica od pomladi neprekinjeno zalegala in so imele ves čas prisotne veliko zalege, torej močne in na videz zdrave družine.

USTREZNA OBRAVNAVA ČEBELJIH DRUŽIN V DRUGI POLOVICI JULIJA

Možnost A – družine z zalego ob napadenosti z varojami, ki presega prag škodljivosti

V družinah s prisotno zalego priporočamo metodo **dolgotrajnega izhlapevanja mravljinčne kisline** z uporabo hlapilnika (npr. Nassenheider univerzal ali professional, Liebig ali FAM) v **trajanju 7-10 dni**. V vročih julijskih dneh priporočamo uporabo Apifor ali Formivar 60 (60% mravljinčna kislina) ali MAQS po navodilu proizvajalca zdravila in veterinarja. Z upoštevanjem priporočene menjave aktivnih učinkovin se lahko pri vseh družinah na stojišču uporabijo tudi naslednja zdravila: Bayvarol (flumetrin), Polyvar yellow (flumetrin), Apivar (amitraz) ali CheckMite (kumafos) v obliki trakov po navodilu proizvajalca in veterinarja.

Možnost B – družine s prekinitvijo zaleganja – omejitev matice

Enkratno zdravljenje vseh družin brez zalege z metodo pršenja z zdravilom Oxuvar po navodilu proizvajalca in veterinarja, z zaključitvijo postopka konec julija.

Možnost C – odstranitev vse zalege, kadar je prag škodljivosti napadenosti z varojami močno presežen

Enkratno zdravljenje družine brez zalege z metodo pršenja z zdravilom Oxuvar po navodilu proizvajalca in veterinarja.

Pripravili veterinarji specialisti za zdravstveno varstvo čebel VF NVI